

Fiche LiSA: Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les âges

Fiche LiSA | Fiche LiSA

- Définition générale
- Définition de ce que ne sont PAS les troubles à symptomatologie somatique et apparentés
- Prévalence générale
- Prévalence des principaux troubles
- Connaître les facteurs prédisposants, précipitants et de maintien ou d'aggravation
- Sémiologie des principaux troubles
- Connaître les principes généraux de la prise en charge
- Spécificités chez le sujet jeune
- Connaître les indications d'une évaluation psychiatrique
- Connaître les indications des thérapeutiques non médicamenteuses
- Connaître les indications et non-indications des médicaments psychotropes

Définition générale 2C-072-DE-A01

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-DE-A01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les âges
Rang	A
Intitulé	Définition générale
Description	Savoir qu'il existe plusieurs systèmes nosographiques parallèles Définition des troubles à symptomatologie somatique (DSM-5) Définition des syndromes somatique fonctionnels (exemple du syndrome du colon irritable, de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique) Définition du syndrome de détresse corporelle (CIM-11)
Rubrique	01-Définition
Contributeurs	
Ordre	1

Les **troubles à symptomatologie somatique** (TSS) (DSM-5) peuvent être définis comme la chronicisation de symptômes physiques médicalement non expliqués avec un retentissement sur la qualité de vie.

Les TSS sont appelés : **syndromes somatiques fonctionnels** (SSF) par les somaticiens : par exemple le syndrome du côlon irritable ou la fibromyalgie.

Le terme **syndrome de détresse corporelle** (*bodily distress disorder*: CIM-11) reconnaît la souffrance des malades, mais le mot détresse à une connotation « psychique ».

Définition de ce que ne sont PAS les troubles à symptomatologie somatique et apparentés 2C-072-DE-A02

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-DE-A02
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les âges
Rang	A
Intitulé	Définition de ce que ne sont PAS les troubles à symptomatologie somatique et apparentés
Description	Simulation, trouble factice, obsession d'une dysmorphie corporelle, facteurs psychologiques affectant d'autres affections médicales
Rubrique	01-Définition
Contributeurs	
Ordre	2

Les TSS ne sont ni une réaction psychique à des symptômes physiques ni une dépression cachée.

Les termes utilisés sont : absence de cause organique = origine psychiatrique.

Origine psychiatrique :

- Pour les patients : rarement acceptable
- Pour les médecins : risque de simplification et de séparation du soma-psyché.

Substratum organique possible, au moins partiel : les symptômes ne sont plus nécessairement inexpliqués.

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PE-B01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Prévalence générale
Description	Entre 5 et 10% des contrôles antidopage positifs (variations entre les disciplines)
Rubrique	02-Prévalence, épidémiologie
Contributeurs	
Ordre	3

Prévalence de l'expression de symptômes médicalement non expliqués en soins primaires : entre 40 et 49 %.

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PE-B02
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Prévalence des principaux troubles
Description	Trouble à symptomatologie somatique ; Crainte excessive d'avoir une maladie ; Trouble de conversion / à symptomatologie neurologique fonctionnelle
Rubrique	02-Prévalence, épidémiologie
Contributeurs	
Ordre	4

Prévalence d'un diagnostic ponctuel d'au moins un TSF : entre 26,2 et 34,8 %.

La prévalence d'un SSF varie avec le SSF par exemple 1,6 % pour la fibromyalgie (INSERM 2020).

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-EP-B01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Connaître les facteurs prédisposants, précipitants et de maintien ou d'aggravation
Description	Connaître l'intrication entre facteurs de risque biologiques, psychologiques et sociaux Savoir que c'est essentiellement sur les facteurs de maintien ou d'aggravation qu'il est possible d'agir : conditionnement, focalisation attentionnelle, conduites d'évitement, catastrophisme
Rubrique	03-Éléments physiopathologiques
Contributeurs	
Ordre	5

Facteurs favorisants :

- des événements traumatiques de l'enfance
- des événements de vie

Facteurs prédisposants :

- un antécédent de maladie « *organique* »
- des résultats d'analyses et d'imagerie en faveur d'une maladie à un stade infraclinique
- la culture et/ou l'éducation : consultations, traitements ou non en cas de plaintes dans l'enfance
- le système de santé et l'accès aux soins
- l'épigénétique : discipline étudiant la nature des mécanismes modifiant de manière réversible l'expression des gènes sans changer la séquence de l'ADN

Facteurs étiologiques :

- les théories neurobiologiques : excès de nociception résultant d'une sensibilisation centrale
- la théorie du système nerveux central « bayésien » : qui construirait son environnement à l'aide de paris y compris l'état du corps et ferait de mauvais paris dans le cadre des SSF

Facteurs précipitants :

- des accidents de la vie
- des maladies aiguës
- des évènements traumatiques.

Facteurs d'entretien :

- l'absence de support personnel et professionnel
- le déconditionnement voire l'évitement de l'effort ou des actes de la vie quotidienne

Facteurs de chronicisation :

- un niveau élevé d'inquiétude pour sa santé
- des comorbidités anxio-dépressives
- la conviction d'être malade
- la perte de confiance dans les professionnels de santé avec la multiplication des examens, des avis, voire un recours à des médecines dites alternatives et complémentaires
- les bénéfices primaires : résoudre ou soulager un conflit intrapsychique avec la reconnaissance du statut de malade pour restaurer une identité sociale
- les bénéfices secondaires : obtenir des gratifications matérielles (exemple : arrêts de travail)
- les interactions entre facteurs prédisposants, précipitants, facteurs étiologiques et de chronicisation (*exemple* : antécédent de maladie dans l'enfance + évènement de vie + mauvais pari + excès de nociception = déconditionnement à l'effort : chronicisation).

Facteurs d'aggravation :

- ex. le déconditionnement voire l'évitement de l'effort ou des actes de la vie quotidienne

Sémiologie des principaux troubles 2C-072-DP-A01

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-DP-A01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	A
Intitulé	Sémiologie des principaux troubles
Description	Trouble à symptomatologie somatique ; Crainte excessive d'avoir une maladie ; Trouble de conversion / à symptomatologie neurologique fonctionnelle
Rubrique	04-Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	6

Un ou plusieurs SSF peuvent être présents.

Pas de substratum organique : le plus souvent

Si substratum organique : il n'explique pas l'ampleur du phénomène et les traitements habituels sont moins efficaces.

Critères diagnostiques psychocomportementaux :

Souvent retrouvés par les médecins et parfois reconnus par les patients :

- un niveau élevé d'anxiété pour la santé
- une attention importante, voire exagérée au corps

Comorbidités :

Autant de comorbidités anxieuses et dépressives que pour les pathologies dites organiques : ex. mêmes niveaux d'anxiété et de dépression chez les patients atteints de fibromyalgie que chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.

Évolutions :

- Disparition
- Régression
- Persistance

Niveaux de sévérité différents :

- symptômes spontanément résolutifs
- TSS (DSM-5) de plus de six mois
- handicaps sur le long terme

Facteurs prédictifs de sévérité et d'itinéraires complexes :

- multiplicité des symptômes
- niveau élevé d'anxiété pour sa santé
- mauvaise qualité de vie personnelle et professionnelle

Chevauchements :

- Entre SSF : fréquents (ex. fibromyalgie et SII) avec un débat quant à l'unicité ou à la diversité de ces entités nosologiques.
- Avec certaines pathologies comme les douleurs chroniques du rachis cervical ou lombaire.

Connaitre les principes généraux de la prise en charge 2C-072-PC-A01

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PC-A01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	A
Intitulé	Connaitre les principes généraux de la prise en charge
Description	Connaitre les critères de non hospitalisation et les critères d'hospitalisation
Rubrique	09-Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	7

Première étape du soin : la reconnaissance et la légitimation des symptômes :

Sans cette étape, les patients sont amenés à combattre pour cette reconnaissance et à revendiquer leur invalidité : ce qui rend difficile le processus de guérison s'ils ont à prouver qu'ils sont malades.

Prendre en compte la complexité décrite dans le modèle biomédico psychosocial :

En intégrant l'agenda du patient (croyances, représentations, attentes, émotions) à l'agenda du médecin (historique médical, examen clinique).

- évite une relation médecin-patient insatisfaisante, voire iatrogène
- permet la réunion de « *la maladie du médecin (disease)* » réalité biologique objectivable et « *la maladie du malade (illness)* » réalité subjective issue de l'expérience vécue

Recueillir le récit du patient dans le cadre d'une approche centré patient :

En réalisant un entretien ouvert comprenant le recueil de :

- TOUS les symptômes contrairement à un interrogatoire avec des questions fermées retrouvant uniquement les symptômes appartenant à une entité biomédicale
- leur interprétation profane
- les émotions associées
- l'expérience socialement construite du SSF (interaction avec l'entourage)
- les facteurs favorisant au rythme du patient qui se confie au fil des entretiens.

Ce récit (médecine narrative) permet de donner du sens : une action thérapeutique.

Les mots choisis rendent compte de l'expérience vécue par le malade et font sens à la fois pour le patient et le médecin.

La métaphore personnalisée (amenée par le patient) fournit une explication plausible (exemple : l'anxiété crée la tension musculaire...).

Prendre en compte le besoin de légitimation sociale : « *maladie socialisée (sickness)* » :

Maladie : conduite sociale déviante non sanctionnée suscitant soins et compassion sous réserve qu'elle soit imputée à un agent situé au-delà de la volonté de l'individu. Il est plus facile d'avoir une maladie de Lyme chronique qu'un syndrome de fatigue chronique : la légitimité est acquise du fait d'une attribution exogène.

Utiliser la réassurance :

En donnant au patient l'assurance de « l'expertise du soignant et de l'engagement de celui-ci à être attentif et disponible ».

Prendre en compte le concept de prévention quaternaire :

Pour éviter :

- l'inquiétude des patients et le coût élevé pour le système de soins liés aux multiples examens et avis complémentaires
- de probables incidentalomes

Rendre compte de la complexité à l'aide de causalité circulaire :

- interactions des facteurs prédisposant, précipitants et de chronicisation
- s'éloigner des causalités linéaires simplificatrices « c'est dans votre tête, c'est une dépression masquée »

Pièges à éviter :

- séparer soma et psyché dans un dualisme cartésien
- considérer un SSF comme « moins réel », toujours « psychogène », voire « imaginaire »
- percevoir les patients inconsciemment (ou consciemment) comme responsables de leurs symptômes et de leurs SSF (voire coupables)
- reprocher l'absence de guérison aux patients coupables
- se centrer sur « disease »
- favoriser l'errance diagnostique et thérapeutique en multipliant les avis et examens complémentaires = favorise l'endossement de l'identité de malade et n'a aucun effet durable de réassurance.
- classer ces patients comme « pénibles » ou « heartsink patients » du fait des difficultés de prise en charge.

Spécificités chez le sujet jeune 2C-072-PC-B01

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PC-B01
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Spécificités chez le sujet jeune
Description	Education de l'enfant et de son entourage
Rubrique	09-Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	8

La démarche de recours aux soins est la plupart du temps effectuée par les parents et non par les enfants et adolescents eux-mêmes.

Connaitre les indications d'une évaluation psychiatrique 2C-072-PC-B02

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PC-B02
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Connaitre les indications d'une évaluation psychiatrique
Description	None
Rubrique	09-Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	9

Les patients peuvent être adressés à un psychiatre ou un psychologue pour la réalisation des thérapies cognitivo-comportementales (TCC).

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PC-B03
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Connaitre les indications des thérapeutiques non médicamenteuses
Description	TCC - Exercice physique
Rubrique	09-Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	10

Les thérapies cognitivocomportementales (TCC)

Efficacité :

Efficaces même à long terme.

Réduisent la sévérité des symptômes et leur comorbidité anxieuse et dépressive.

Limites :

Nombre de soignants formés aux TCC insuffisant.

Consultations de certains professionnels (psychologues par exemple) non remboursées en ambulatoire.

Pistes d'amélioration pour la prise en charge : une formation à la TCC :

- Public cible : tous les médecins en contact avec des patients présentant des SSF
- Durée : 14 heures
- Objectifs :

*apprendre à expliquer les SSF

*apprendre à réassurer les patients

*apprendre à éviter de demander des avis et examens complémentaires inutiles

L'explication de l'origine cérébrale :

déséquilibre entre l'anticipation cognitive et les perceptions corporelles.

Objectifs :

- diminuer l'anticipation cognitive
- redonner sa place aux perceptions corporelles

Exemple du bain chaud pour expliquer la théorie bayésienne : l'immersion du corps dans l'eau très chaude est souvent désagréable, voire douloureuse. Après quelques secondes, la sensation douloureuse disparaît alors même que la température de l'eau n'a pas changé. Lors de l'immersion, le cerveau a anticipé une potentielle brûlure. Ce pari a été corrigé par les signaux nerveux périphériques. Devant l'absence de lésion, le caractère désagréable, et douloureux disparaît.

La rééducation physique en cas de fibromyalgie

lutte contre l'évitement dû à l'anticipation cognitive douloureuse et contre le déconditionnement physique (facteur d'entretien et d'aggravation).

Objectif de connaissance	
Identifiant	2C-072-PC-B04
Item parent	Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les ages
Rang	B
Intitulé	Connaitre les indications et non-indications des médicaments psychotropes
Description	None
Rubrique	09-Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	11

Antidépresseurs (tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine avec ou sans action sur la noradrénaline) et psychotropes

Pas d'efficacité supérieure au placebo.

Les effets indésirables peuvent amplifier les symptômes.

Les antidépresseurs peuvent être éventuellement utiles pour traiter les comorbidités anxieuses et dépressives.

Produits dits naturels (phytothérapie, etc.)

Pas d'efficacité supérieure au placebo.

Récupérée de « [https://sides.uness.fr/lisa/index.php?](https://sides.uness.fr/lisa/index.php?title=Fiche_LiSA:Troubles_à_symptomatologie_somatique_et_apparentés_à_tous_les_ages&oldid=45004)

[title=Fiche_LiSA:Troubles_à_symptomatologie_somatique_et_apparentés_à_tous_les_ages&oldid=45004](https://sides.uness.fr/lisa/index.php?title=Fiche_LiSA:Troubles_à_symptomatologie_somatique_et_apparentés_à_tous_les_ages&oldid=45004) »

La dernière modification de cette page a été faite le 2 mars 2021 à 20:28.